

BACTÉRIOLIT®

TECHNOLOGIE MARCEL MÉZY®
koncentrovaný

Komplex mikroorganismů do podestýlky a hnoje na kompostování.
Splňuje normu NF U44-051

Skompostuje hnůj přímo v maštali: už nemusíte zaorávat ani nechat odležet několik měsíců. Po třech až šesti týdnech se dá kompost aplikovat na půdu.

Zlepšuje klima v maštali: sníží vylučování amoniaku až o 85 %.

ZPŮSOB ÚČINKU

- Aditivum do podestýlky, hnoje, hnojovice a na kompostování organické hmoty obsahující přírodní minerály a vybrané rostliny skompostované se spontánně narostlými mikroorganismy vyprodukovanými technologií Marcel Mézy®
- Aktivuje biologickou přeměnu hnoje, tekutého hnoje, organického odpadu vedlejších produktů a jakékoli jiné organické hmoty na humus (kompost)
- Dá se použít na hlubokou podestýlku, do lehoven, do hnojovice a do digestátu podle vašich technologií

BACTÉRIOLIT VÁM UMOŽNÍ

- Sníží vylučování minerálů do podzemních vod a ovzduší
- Snižuje infekční nábor patogenních mikroorganismů v prostředí zvířat jako aj amoniakální zápach v maštalích
- Menší úniky amoniaku do ovzduší
- Přírodněji kompost bez mechanické úpravy
- Snížení tvorby povrchové kůry při hnojovici a digestátu
- Přestat používat P, K, Ca a méně dusíka na půdu s Bacteriolitem v aplikovaném hnoji



APLIKACE

- Frekvence aplikace závisí od efektu, jaký chcete dosáhnout:
 - Skompostování hluboké podestýlky– v jedné až dvou aplikacích v dávce 1 až 2 kg/m³ hnoje, hnojovice, digestátu.
 - Do kompostu 30 až 60 g na 100 litrů (1–2 hrsti na 100 litrů).
 - Při aplikaci Bacteriolitu stačí posypat na hnojovou kopu, tak aby hnojová kopa byla upravená do tvaru dlouhé štrůdlě ne vyšší jak 1,5 metra a ne širší jak 3 metry, nakolik Bacteriolit umí skompostovat hnůj až do hloubky 1 metr, vid' obrázek dolu.
 - Ozdravení prostředí – raz týdně v malých množstvích 2 až 6 kg na VDJ/měsíčně (VDJ – je velká dobytčí jednotka 1VDJ = 1kráva).
- Třeba přizpůsobit aplikovanou dávku tak, aby se při rozhazování ošetřeného hnoje (kompostu) na půdu, aby se dodržela koncentrace 30–40 kg koncentrovaného Bacteriolitu na ha. Je to přibližně 1– 2 kg Bacteriolitu na 1m³ hnoje.



Při aplikaci ošetřeného hnoje na půdu:

- Nepoužívat simultánně s jinými chemickými produkty s baktericidním, fungicidním nebo herbicidním účinkem, s vápnem, superfosfátem, dezinfekcí a jinými pesticidy, s minimálním odstupem 14dní.
 - Pro dodržení opakování můžete kombinovat s Bacteriosolem.
- Pro dosažení deklarovaných účinků na hloubku ornice doporučujeme opakovat 3–4 aplikace v intervalech 5–12 měsíců.



Distributor:

www.potrebakrmenia.sk